



BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.9 /O/ 23.04.2018

Condițiile climatice din ultima perioadă, sunt favorabile apariției și dezvoltării agenților fitopatogeni și dăunătorilor specifici culturilor de arbuști fructiferi (afin, coacăz, agriș, zmeur, mur) și culturilor căpșun, care dacă nu sunt tratate la timp pot să producă mari pagube acestor culturi, diminuând semnificativ recolta.

În culturile de afin- Pentru prevenirea și combaterea agenților fitopatogeni și dăunători specifici afinului de cultură: monilioza (*Monilinia vaccinii corymbosi*), alternarioza (*Alternaria tenuissima*), antracnoza (*Gloeosporium minus*), septorioza (*Septoria albopunctata*), ruginile (*Puccinia astrum vaccinii*), boli de scoarță și lemn dar și a dăunătorilor - Tântărașul (*Dasineura oxycoccana* Jonson), gărgărița fructelor, insecte defoliatoare, acarieni, afide, dăunători de scoarță și lemn, se vor aplica 2 tratamente fitosanitare utilizând la alegere una din următoarele combinații astfel:

1. FOLPAN 80 WDG 0,2% sau DITHANE M-45 0,2 % + MOSPILAN 20 SG/ KRIMA 20 SG 0,02% sau MAVRIK 2F 0,05%;
2. ORIUS 25 EW/SALVATOR 25 EW 0,05% sau SYLLIT 400 SC 0,2% + CALYPSO 480 SC 0,02 ;
3. FOLICUR SOLO 250 EW 0,1% sau TOPSIN 70 WDG 0,07%+ NURELLE D 50/500 EC 0,075%;

Perioada optimă de tratament:

T₁ - înălțarea inflorescențelor- până la apariția primei flori.

T₂- Dacă în perioada înfloritului se realizează minim 3 mm precipitații și o umiditate atmosferică peste 75% se recomandă aplicarea unui tratament pentru combaterea moniliozei utilizând produsul: SIGNUM 0,05%

La culturile de agriș și coacăz – Pentru prevenirea și combaterea complexului de boli foliare și a dăunătorilor specifici culturilor de coacăz și agriș ca: făinarea americană a agrișului (*Sphaerotheca mors- uvae*), antracnoza (*Pseudopeziza ribis* Kleb.), alte boli de lemn, scoarță și foliare, dar și dăunători ca: afide, păduchi lănoși, țestoși, țânțarul frunzelor de coacăz (*Dasineura tetinsu*), sfedelitorul tulpinilor (*Synanthedon tipuliformis*), defoliatoare, acarieni, se vor efectua 2 tratamente fitosanitare utilizând la alegere unul din următoarele combinații astfel:

1. NURELLE D 50 /500 EC 0,075% + ORIUS 25 EW/SALVATOR 25 EW 0,05% sau TOPAS 100 EC 0,05%;
2. CALYPSO 480 SC 0,02% + MICROTHIOL SPECIAL 0,4% sau SULPHUR 80 WG 0,3% ;

Perioada optimă de tratament:

Tratamentul I- 24- 29.04.2018;

Tratamentul II- se va repeta la 8-10 zile.