



BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.5/O/ 20.04.2018

Condițiile climatice din ultimele zile, au favorizat, apariția și dezvoltarea dăunătorilor și bolilor ca: viespile cu ferăstrău (*Hoplocampa minuta* CH. și *Hoplocampa flava* L.), viespea sămburilor de prun (*Eurythoma schreineri*) - adulți, insecte defoliatoare- carabușul de mai, afide, moniliozele, ciuruirea micotică și bacteriană la cireș și vișin, bășicarea frunzelor de piersic, (*Taphrina deformans*), ciuruirea frunzelor (*Coryneum* b.), precum și alți patogeni bacterieni și micotici care pot cauza pierderi importante **la speciile sămburoase.**

La specia prun- pentru prevenire și combaterea viespilor cu ferăstrău (*Hoplocampa minuta* CH. și *Hoplocampa flava* L.), se vor efectua 2 tratamente utilizând la alegere una din rețetele de mai jos astfel:

Tratamentul I – conține în special pentru viespile cu ferăstrău (*Hoplocampa minuta* CH. și *Hoplocampa flava* L.), monilioze pătarea roșie a frunzelor de prun.

1. RUNNER 2 F 0,04% sau CALYPSO 480 SC 0,02% + SIGNUM 0,05%;
2. FASTER 10 CE 0,025% sau KARATE ZEON 0,015% + ORIUS 25 EW 0,1% sau TOPSIN 70 WDG 0,07%

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: la 10-15 % petale scuturate și se va încheia în 5-6 zile.

Tratamentul II – Pentru prevenirea și combaterea dăunătorului **viespea sămburilor de prun (*Eurythoma schreineri*)** se va efectua un tratament fitosanitar, pentru combaterea insectei utilizând la alegere una din următoarele rețete:

1. NURELLE D 50/500 EC 0,075% sau MOVENTO 100 SC 1,875 l/ha (0,1875%) + FOLICUR SOLO 250 EW 0,1%
3. KARATE ZEON 0,15% + ORIUS 25 EW 0,1% + FOLPAN 80 WDG 0,2%.

Tratamentul conține și pentru monilioze, bășicarea frunzelor de piersic, ciuruirea frunzelor, fainarea piersicului.

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: **la 6 zile de la tratamentul anterior** și se va încheia în 5-6 zile

La speciile cireș și vișin- se vor aplica două tratamente pentru prevenirea și combaterea moniliozelor (*Monilinia laxa* și *Monilinia fructigena*), antracnoza (*Cocomyces hiemalis*), ciuruirea micotică (*Stigmia carpophylla*), alți patogeni bacterieni și micotici, afide, insecte defoliatoare, acarieni, cărbușul de mai, care pot cauza pierderi importante în livezile de cireș și vișin.

Pentru prevenire și combatere se recomandă:

1. FOLICUR SOLO 250 EW 0,1% sau ORIUS 25 EW 0,1% + CALYPSO 480 SC 0,02% ;
2. SIGNUM 0,05% sau TELDOR 500 SC 0,08% + KARATE ZEON 0,015% ;
3. LUNA EXPERIENCE 0,05% + DECIS MEGA 50 EW 0,015%;

Perioada optimă de tratament: T1 - 15-20% flori cu petale scuturate;

T2 - La interval de 8-10 zile

La piersic și cais- se vor efectua 2 tratamente fitosanitare la interval de 8-10 zile de prevenire și combatere a moniliozelor (*Monilinia laxa*, *Monilinia fructigena*, *Monilinia fructicola*) *Taphrina deformans* la piersic, *Botrytis cinerea*, bol de scoarță și lemn, a afidelor, insectelor defoliatoare și alți dăunători de scoarță și lemn, care pot cauza pierderi importante la piersic și cais, utilizând la alegere una din combinațiile propuse astfel:

T1 - Scuturare- 15-20% flori cu petale scuturate

1. PROLECTUS 0,8-1,2 kg/ha sau TELDOR 500 SC 0,08% + MAVRIK 2 F 0,05% sau
2. SYLLIT 400 SC 0,2% sau SIGNUM 0,05% + KARATE ZEON 0,015%;

T2- la interval de 8-10 zile de la tratamentul anterior.