



BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.7/0/ 23.04.2018

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolilor și dăunătorilor ca: Făinarea (*Uncinula necator*) T₁, acarieni (*Calepitrimerus* spp., *Colomerus vitis*, *panonychus ulmi*, etc), T₁, antracnoza, mana, filoxera galicolă, cărăbuși, afide, agenți de dăunare foarte periculoși, care pot cauza pierderi importante la **vița de vie**.

Pentru prevenire și combatere se vor executa două tratamente după cum urmează:

Tratamentul I – Făinare (*Uncinula necator*) T₁, acarieni T₁

1. SULFOMAT 80 PU 0,4% sau COSAVET 80 DF 3kg/ha + MILBEKNOCK EC 0,075%;
2. KARATHANE GOLD 350 EC 0,5 l/ha sau SULPHUR 80 WG 3,0 kg/ha+ NISSORUN 10 WP 0,4l/ha.

Recomandări: Tratamentul va începe în parcelele unde s-au realizat următoarele condiții:

- a) atacul a fost intens în anul anterior și cu soiurile sensibile la făinare;
- b) acarieni: P.E.D. 15 acarieni/lăstar sau 3 -5 acarieni/frunză
- c) fenofaza - **lastar de 5-7 cm (3-4 frunzulițe adevărate);**

Perioada optimă de tratament: 24.04- 30.04.2018

Se pot folosi și alte produse recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Alte recomandări: Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra. Nu se va stropi la temperaturi mai mari de 25 °C.

Tratamentul II – făinare (*Uncinula necator*) T₂, mană T₁ (*Plasmopara viticola* Berk.), acarieni T₂, se aplică la faza fenologică de 20-25 cm creșterea lăstarilor (degajarea ciorchinilor) și are caracter curativ pentru făinare, acarieni și preventiv pentru mană, utilizând la alegere una din următoarele rețete astfel:

1. MICROTHIOL SPECIAL 0,2-0,3% + ANTRACOL 70 WP 0,2-0,3% + ORTUS 5 SC 0,5 l/ha;

Dacă creșterile vegetative sunt rapide și riscurile de infecție cu mană sunt ridicate (ploi abundente, umiditate atmosferică ridicată) se recomandă aplicarea produselor astfel:

1. MILDICUT (YSAYO) 2, 0l/ha + SALVATOR 25 EW 0,4 l/ha + MILBEKNOCK EC 0,075% -

2. MANOXIN M 60 PU 4,0 kg/ha sau MANOXIN C 50 PU 4,0 kg/ha + SAFRAN 1,8 EC/ VARGAS 1,8 EC 1,0 l/ha;

Recomandări: Tratamentul se aplică unde s-au întrunit următoarele condiții:

- Umiditate atmosferică peste 80%;
- temperatura minimă a aerului dimineața de 10°C;
- ploaie de 10 mm căzută în ultimele 24 - 48 ore;
- frunze de cel puțin 5 cm Ø sau lastar de 20-25 cm lungime – și minim 2-3 frunze crescute în medie pe lăstar;

Perioada optimă de tratament: 07-12.05.2018

Fenofaza de 20-25 cm creșterea lăstarilor (degajarea ciorchinilor)

ALTE RECOMANDĂRI

Se pot folosi și alte produse recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Tratamentele se pot aplica numai la temperaturi sub 25 °C.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe perioadele de remanență a produselor de protecția plantelor utilizate, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din*